

Артикуляционная гимнастика



для шипящих звуков



Артикуляционная гимнастика для шипящих звуков

— комплекс упражнений для подготовки органов артикуляции (языка, губ, щек, мягкого неба) к постановке шипящих звуков Ш, Ж, Ч, Щ.

Нарушения произношения шипящих звуков

1. Щёчное произношение шипящих. Язык не участвует в произношении, выдыхаемая струя уходит в сближенные зубы и прижатые к ним уголки рта. При этом образуется тупой шум.
2. Заднеязычное произношение шипящих. Выдыхаемая струя проходит через щель, образованную между задней спинкой языка и твердым небом. Получается звук, напоминающий Х.

Часто звуки Ш, Ж, Ч, Щ заменяются другими звуками. Такое нарушение называется парасигматизмом шипящих. Замены звуков чаще всего происходят на фоне недоразвития фонематического слуха, это следует учитывать при коррекции такого нарушения звукопроизношения.

Звук Ш чаще всего заменяется на С, Т, Ж, Щ, Х, З.

Звук Ж чаще всего заменяется на З, Ш, С, Д.

Звук Ш чаще всего заменяется на СЪ, Ш, Т, Ч, СТ, ШЧ.

Звук Ч чаще всего заменяется на Щ, ТЬ, С, Ц.

Перед каждым логопедическим занятием в группа «Ромашка» и «Одуванчик» проводится артикуляционная гимнастика, которая включает в себя упражнения, направленные на шипящие звуки.

Артикуляционная гимнастика для шипящих звуков:




«Лопатка»: улыбнуться; приоткрыть рот; положить широкий передний край языка на нижнюю губу; удержать язык в таком положении подсчет 1 до 5-10; важно следить, чтобы нижняя губа не напрягалась и не натягивалась на нижние зубы.



«Качели»: рот открыт. Губы в улыбке, чтобы были видны все зубы. Кончик языка поднимается за верхние зубы на «бугорки» (альвеолы), затем отпускается вниз за нижние

зубы. Выполнять по команде – «вверх-вниз» Нижняя челюсть неподвижна (постепенно увеличивая счёт от 1 до 10).



«Чашечка»: открыть рот; широкий расслабленный язык поднять к верхней губе; прогнуть среднюю часть языка, загнув кверху боковые



«Грибочек»: улыбнуться; присосать широкий язык к нёбу, растягивая подъязычную связку.





«Бублик»: зубы сомкнуть. Губы округлить и чуть вытянуть вперед так, чтобы верхние и нижние резцы были видны. Удерживать.



Выполняя эти упражнения правильно и регулярно вы поможете своему ребенку быстрее справиться с неправильным произношением шипящих звуков. Иногда длительного выполнения этих упражнений (1-2 месяца) будет достаточно для того, чтоб звуки самостоятельно появились в речи.

Информацию подготовила: учитель-логопед МАДОУ д/с №162 к.3. г. Тюмень Маслова Кристина Андреевна.

Май, 2023 год.